

Inhalt

Koronarchirurgie, isoliert..... 2

 Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna 3

 28243 4

 Postoperative Mediastinitis 6

 28245 7

 76329 9

 Postoperative Retentionsstörung 11

 47907 12

 Neurologische Komplikationen..... 14

 47916 15

 47917 17

 Letalität 19

 28269 21

 70419 23

 28272 25

 66755 27

 66781 35

 65560 43

 66772 48

 47942 53

 47944 55

 47954 57

Koronarchirurgie, isoliert

| | |
|--|--|
| Einleitung Leistungsbereich | |
| Leistungsbereich | Koronarchirurgie, isoliert |
| Historie | |
| Einleitung | <p>Die koronare Herzerkrankung ist nach der arteriellen Hypertonie die häufigste Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems in den Industrieländern. Bei dieser Erkrankung kommt es infolge von Verengungen oder Verschlüssen in den Herzkranzgefäßen zu einer Minderdurchblutung der von diesen Gefäßen versorgten Abschnitte des Herzmuskels. Die Minderdurchblutung kann sich klinisch als Angina-Pectoris-Beschwerden bemerkbar machen. Der akute Verschluss eines Koronargefäßes führt zum Herzinfarkt.</p> <p>Als Therapieoptionen bei koronarer Herzerkrankung stehen die medikamentöse Behandlung, die Behandlung mittels Herzkatheter (Dilatation oder Stent) und die Operation (Bypass) zur Verfügung.</p> <p>In diesem BQS-Leistungsbereich werden Qualitätsaspekte der operativen Versorgung verengter Herzkranzgefäße mittels körpereigener Venen oder Arterien (Arteria mammaria interna, Arteria radialis) betrachtet. Für die Analyse werden ausschließlich isolierte koronarchirurgische Operationen unter Verwendung der Herz-Lungen-Maschine herangezogen.</p> |

Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna

| | |
|--|---|
| Definition Qualitätsindikator | |
| Laufende Nummer Indikator | 1 |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna |
| Qualitätsziel | Angemessener Anteil von Operationen mit Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna (innere Brustwandarterie) |
| Indikatortyp | Prozessindikator |
| Rationale | <p>Die Auswahl des Bypass-Materials in der Koronarchirurgie ist von entscheidender Bedeutung, da der Verschluss eines Bypassgefäßes unmittelbare Auswirkungen auf die kardiale Morbidität und Letalität hat.</p> <p>Als Bypassgefäße werden hauptsächlich Beinvenen oder die innere Brustwandarterie (Arteria mammaria interna, IMA) verwendet.</p> <p>Autologe Venen unterliegen im Laufe der Zeit morphologischen Veränderungen, die zu einer Stenose bzw. einem Verschluss des Bypassgefäßes führen können (Grondin et al.1984). So sind zehn Jahre nach einer Bypassoperation nur noch 41% aller Venenbypässe offen (Barner et al.1985). Bei Verwendung der IMA als Bypass-Graft ist diese Rate mit 83% mehr als doppelt so hoch. Gleichzeitig treten signifikant weniger Angina pectoris-Beschwerden oder Myokardinfarkte auf. Ebenfalls wird seltener eine Reoperation oder PTCA zur Eröffnung stenosierter Gefäße erforderlich. Die 10-Jahresüberlebensrate ist ebenfalls höher (Loop et al.1986, Acinapura et al. 1989).</p> <p>Die American Heart Association empfiehlt in ihrer 2004 überarbeiteten Leitlinie, die Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna bei allen Patienten zu erwägen, die sich einer operativen Revaskularisation der linken Koronararterie (LAD) unterziehen müssen (Empfehlungsgrad I, Evidenzgrad B nach den Kriterien der American Heart Association) (Eagle et al. 2004).</p> |
| Literaturverzeichnis | <p>Acinapura AJ, Rose DM, Jacobowitz IJ, Kramer MD, Robertazzi RR, Feldman J, Zisbrod Z, Cunningham JN. Internal mammary artery bypass grafting: influence on recurrent angina and survival in 2.100 patients. Ann Thorac Surg 1989; 48 (2): 186-191.</p> <p>Barner HB, Standeven JW, Reese J. Twelve-year experience with internal mammary artery for coronary artery bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 1985; 90 (5): 668-675.</p> <p>Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, Edwards FH, Ewy GA, Gardner TJ, Hart JC, Herrmann HC, Hillis LD, Hutter AM, Jr., Lytle BW, Marlow RA, Nugent WC, Orszulak TA. ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery). Circulation 2004; 110 (14): e340-e437.</p> <p>Grondin CM, Campeau L, Lesperance J, Enjalbert M, Bourassa MG. Comparison of late changes in internal mammary artery and saphenous vein grafts in two consecutive series of patients 10 years after operation. Circulation 1984; 70 (3 Pt 2): I208-I212.</p> <p>Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, Stewart RW, Goormastic M, Williams GW, Golding LA, Gill CC, Taylor PC, Sheldon WC. Influence of the internal-mammary-artery graft on 10-year survival and other cardiac events. N Engl J Med 1986; 314 (1): 1-6.</p> |

28243

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------|----------|------|---------------------|--|----------|-------|-------------------|--|--------------|------|---------------|---|---------------|-------|-----------|--------------------|----------------|-------|------------------|--------------------|------------------|-------|------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------------|-------|------------------------------|--|----------------|-------|----------------|--------------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ID-Kennzahl | 28243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | >= x% (5%-Perzentile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | >= 78,3% (5%-Perzentile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Die Verwendung der Arteria mammaria interna als Bypassgraft wird in den Leitlinien als Standardverfahren in der Bypasschirurgie aufgeführt. Aus der Literatur lassen sich jedoch keine absoluten Werte herleiten, die trennscharf die Differenzierung zwischen guter und verbesserungsbedürftiger Qualität ermöglichen. Daher hat die Fachgruppe Herzchirurgie hier eine Perzentile als Referenzbereich festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten mit Verwendung der linksseitigen Arteria mammaria interna als Graft Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden mit Verwendung eines Grafts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II:3</td> <td>OP-Protokoll Nummer</td> <td></td> <td>OPNUMMER</td> </tr> <tr> <td>II:46</td> <td>Anzahl der Grafts</td> <td></td> <td>GRAFTSANZAHL</td> </tr> <tr> <td>II:8</td> <td>Dringlichkeit</td> <td>1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio)</td> <td>DRINGLICHKEIT</td> </tr> <tr> <td>II:48</td> <td>ITA links</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>GRAFTSITALINKS</td> </tr> <tr> <td>II:34</td> <td>Koronarchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>KORONARCHIRURGIE</td> </tr> <tr> <td>II:35</td> <td>Aortenklappenchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:74</td> <td>Mitralklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>MITRALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:36</td> <td>sonstige Operation am Herzen</td> <td>0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation</td> <td>HERZOPSONSTIGE</td> </tr> <tr> <td>II:89</td> <td>Pulmonalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PULMONALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:82</td> <td>Trikuspidalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>TRICUSPIDALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:96</td> <td>Aortenaneurysma/Ektasie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENANEURYSMA</td> </tr> <tr> <td>II:115</td> <td>Kongenitale Vitien</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>VITIENKONGENITAL</td> </tr> <tr> <td>II:118</td> <td>Herztumoren</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HERZTUMOR</td> </tr> <tr> <td>II:124</td> <td>Perikarderkrankung</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PERIKARDERKRANKUNGEN</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | II:46 | Anzahl der Grafts | | GRAFTSANZAHL | II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | II:48 | ITA links | 0 = nein 1 = ja | GRAFTSITALINKS | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:46 | Anzahl der Grafts | | GRAFTSANZAHL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:48 | ITA links | 0 = nein 1 = ja | GRAFTSITALINKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. |
|---|---|

Postoperative Mediastinitis

| | |
|--|---|
| Definition Qualitätsindikator | |
| Laufende Nummer Indikator | 2 |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Postoperative Mediastinitis |
| Qualitätsziel | Seltenes Auftreten einer postoperativen Mediastinitis |
| Indikatortyp | Ergebnisindikator |
| Rationale | <p>Die Mediastinitis ist eine schwere und potentiell lebensbedrohliche Komplikation in der Herzchirurgie. Sie tritt in 1 bis 4% aller Operationen auf. Die Letalitätsrate wird mit bis zu 25% angegeben.</p> <p>Der Vergleich der Wundinfektionraten in der Literatur ist allerdings eingeschränkt, da unterschiedliche Wund-Surveillance-Techniken angewandt werden und unterschiedliche Definitionen der tiefen sternalen Wundinfektion existieren (Parisian Mediastinitis Study Group 1996).</p> <p>Als Risikofaktoren gelten neben einer ausgeprägten Adipositas (BMI > 30 kg/m²) der insulinpflichtige Diabetes mellitus und eine erneute Sternotomie während desselben stationären Aufenthaltes. Auch die Verwendung von einer oder beiden Arteriae mammae internae als Bypassgraft erhöht das Risiko, postoperativ eine Mediastinitis zu erleiden. Patientinnen, die wegen eines Mammakarzinoms bestrahlt worden sind, tragen ebenfalls ein höheres Risiko für diese Komplikation.</p> <p>Die routinemäßige prophylaktische perioperative Kurzzeitantibiotikagabe führt zu einer Reduktion der postoperativen Mediastinitisrate um etwa 80% (Kreter & Woods 1992).</p> <p>Mindestens 20% aller Patienten, die sich einer Herzoperation unterziehen müssen, leiden unter einem Diabetes mellitus. Der Blutzuckerspiegel sollte dabei Werte von 200 mg/dl nicht überschreiten (Furnary et al. 1999). Für diese Patienten hat sich die perioperative kontinuierliche intravenöse Insulintherapie als günstig zur Prophylaxe perioperativer Wundinfektionen erwiesen.</p> <p>In Anlehnung an den vom National Infections Surveillance System der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC entwickelten Risikoscore wird die postoperative Mediastinitisrate nach Risikoklassen stratifiziert dargestellt (Culver et al. 1991).</p> |
| Literaturverzeichnis | <p>Culver DH, Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ, Jarvis WR, Emori TG, Banerjee S, Edwards JR, Tolson JS, Henderson TS, Hughes JM. Surgical Wound Infection Rates By Wound Class, Operative Procedure, and Patient Risk Index. The American Journal of Medicine 1991; 91 (Suppl 3B): 152S-157S.</p> <p>Furnary AP, Zerr KJ, Grunkemeier GL, Starr A. Continuous intravenous insulin infusion reduces the incidence of deep sternal wound infection in diabetic patients after cardiac surgical procedures. Ann Thorac Surg 1999; 67 (2): 352-360.</p> <p>Kreter B, Woods M. Antibiotic prophylaxis for cardiothoracic operations. Meta-analysis of thirty years of clinical trials. J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 104 (3): 590-599.</p> <p>Parisian Mediastinitis Study Group. Risk Factors for Deep Sternal Wound Infection after Sternotomy: A Prospective, Multicenter Study. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 1996; 111 (6): 1200-1207.</p> |

28245

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|------|-------------|-----------|----------|-------|---------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------------------|---|----------------------|------|---------------------|---|-------------------|
| ID-Kennzahl | 28245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich wurde für die risikoadjustierte Mediastinitisrate in der Risikoklasse 0 und 1 festgelegt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | <p>Zähler: Patienten mit Mediastinitis oder tiefer Wundinfektion des Thorax als postoperativer Wundinfektion, Sternumrevision oder Rethorakotomie wegen Mediastinitis</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:9</td> <td>Infektion(en)</td> <td>00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion</td> <td>POSTOPINFEKTION ART</td> </tr> <tr> <td>III:1 1</td> <td>Sternumrevision</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>STERNUMREV</td> </tr> <tr> <td>III:2 1</td> <td>Rethorakotomie / Grund</td> <td>00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade 04 = Graftprobleme, Ischämie 05 = Wundinfektion 06 = Dissektion 07 = Prothesendysfunktion 08 = instabiles Sternum 09 = Chylothorax 10 = Mediastinitis 88 = anderer Grund</td> <td>RETHORAKOTOMIE GRUND</td> </tr> <tr> <td>I:63</td> <td>akute Infektion(en)</td> <td>00 = keine 01 = Mediastinitis 02 = Bakteriämie 03 = broncho-pulmonale Infektion 04 = oto-laryngologische Infektion 05 = floride Endokarditis 06 = Peritonitis 07 = Wundinfektion Thorax 08 = Pleuraempym 09 = Venenkatheterinfektion 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten</td> <td>INFEKTIONAKUTHC H</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:9 | Infektion(en) | 00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | POSTOPINFEKTION ART | III:1 1 | Sternumrevision | 0 = nein 1 = ja | STERNUMREV | III:2 1 | Rethorakotomie / Grund | 00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade 04 = Graftprobleme, Ischämie 05 = Wundinfektion 06 = Dissektion 07 = Prothesendysfunktion 08 = instabiles Sternum 09 = Chylothorax 10 = Mediastinitis 88 = anderer Grund | RETHORAKOTOMIE GRUND | I:63 | akute Infektion(en) | 00 = keine 01 = Mediastinitis 02 = Bakteriämie 03 = broncho-pulmonale Infektion 04 = oto-laryngologische Infektion 05 = floride Endokarditis 06 = Peritonitis 07 = Wundinfektion Thorax 08 = Pleuraempym 09 = Venenkatheterinfektion 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten | INFEKTIONAKUTHC H |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:9 | Infektion(en) | 00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | POSTOPINFEKTION ART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:1 1 | Sternumrevision | 0 = nein 1 = ja | STERNUMREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:2 1 | Rethorakotomie / Grund | 00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade 04 = Graftprobleme, Ischämie 05 = Wundinfektion 06 = Dissektion 07 = Prothesendysfunktion 08 = instabiles Sternum 09 = Chylothorax 10 = Mediastinitis 88 = anderer Grund | RETHORAKOTOMIE GRUND | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:63 | akute Infektion(en) | 00 = keine 01 = Mediastinitis 02 = Bakteriämie 03 = broncho-pulmonale Infektion 04 = oto-laryngologische Infektion 05 = floride Endokarditis 06 = Peritonitis 07 = Wundinfektion Thorax 08 = Pleuraempym 09 = Venenkatheterinfektion 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten | INFEKTIONAKUTHC H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | | 12 = HIV-Infektion 13 = Hepatitis B oder C 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | |
| | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| | II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

76329

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|------|-------------|-----------|----------|------------|---------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|------------------------|--|----------------------|
| ID-Kennzahl | 76329 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | bei Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | <= x% (95%-Perzentile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Diese Qualitätskennzahl wurde 2006 eingeführt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | <p>In diesem Leistungsbereich werden methodenbedingt weniger als 20% der operierten Patienten der Risikoklasse 0, also der Gruppe der Patienten ohne präoperative Risikofaktoren nach den Kriterien der CDC, zugeordnet. Ursächlich hierfür ist die Einstufung der überwiegenden Anzahl der Patienten in die ASA-Gruppen III und IV. Diese Einstufung erscheint angesichts des Risikoprofils der in diesem Leistungsbereich behandelten Patienten plausibel, führt jedoch dazu, dass diese Patienten bei der Auswertung der risikoadjustierten Mediastinitis mindestens der Risikoklasse 1 zugeteilt werden. Für die vergleichende risikoadjustierte Darstellung der Ergebnisse zu diesem Qualitätsindikator wurden daher Patienten der Risikoklassen 0 und 1 zusammengefasst.</p> <p>Die Rate an postoperativer Mediastinitis kann bei einzelnen Krankenhäusern allein aufgrund geringer Fallzahlen von Jahr zu Jahr zwischen 0,5% und 2,5% schwanken. Der Vergleich mit den Daten der Literatur wird zusätzlich durch die unterschiedliche Definition der Mediastinitis erschwert. Die Fachgruppe verzichtete daher auf die Festlegung eines fixen Referenzbereiches.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Additiver Score | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | <p>Zähler: Patienten mit Mediastinitis oder tiefer Wundinfektion des Thorax als postoperativer Wundinfektion, Sternumrevision oder Rethorakotomie wegen Mediastinitis</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | <p>Risikoklassen wurden gebildet gemäß NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) der Centers for Disease Control (Culver et al. 1991). Es wird jeweils ein Risikopunkt vergeben, wenn - ASA >= 3 - OP-Dauer > 75%-Perzentile der OP-Dauer-Verteilung der betrachteten Operationsart - ein kontaminierter oder septischer Eingriff vorliegt. Patienten der Risikoklasse 0 haben keinen Risikopunkt. Patienten der Risikoklasse 1 haben einen Risikopunkt.</p> <p>OP-Dauer > 75%-Perzentile: x min</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:9 1</td> <td>Infektion(en)</td> <td>00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion</td> <td>POSTOPINFEKTION ART</td> </tr> <tr> <td>III:1 1</td> <td>Sternumrevision</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>STERNUMREV</td> </tr> <tr> <td>III:2 1</td> <td>Rethorakotomie / Grund</td> <td>00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade</td> <td>RETHORAKOTOMIE GRUND</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:9 1 | Infektion(en) | 00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | POSTOPINFEKTION ART | III:1 1 | Sternumrevision | 0 = nein 1 = ja | STERNUMREV | III:2 1 | Rethorakotomie / Grund | 00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade | RETHORAKOTOMIE GRUND |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:9 1 | Infektion(en) | 00 = keine / keine weitere 01 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, oberflächlich 02 = Wundinfektion, Thorax oder Bein, tief, nicht raumfordernd 03 = Mediastinitis, Wundinfektion Thorax, tief 08 = akute Endokarditis 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | POSTOPINFEKTION ART | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:1 1 | Sternumrevision | 0 = nein 1 = ja | STERNUMREV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:2 1 | Rethorakotomie / Grund | 00 = keine Rethorakotomie / kein weiterer Grund 01 = Blutung/Hämatom 02 = Low Cardiac Output 03 = Tamponade | RETHORAKOTOMIE GRUND | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|----------------------|
| | | 04 = Graftprobleme, Ischämie 05 = Wundinfektion 06 = Dissektion 07 = Prothesendysfunktion 08 = instabiles Sternum 09 = Chylothorax 10 = Mediastinitis 88 = anderer Grund | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| I:32 | Einstufung nach ASA-Klassifikation | 1 = normaler, ansonsten gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung 4 = Patient mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung 5 = moribunder Patient | ASA |
| II:9 | Wundkontaminationsklassifikation (nach Definition der CDC) | 1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe | PRAEOPCDC |
| II:37 | OP-Zeit (Schnitt-Nahtzeit) | | OPDAUERHCH |
| II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | |
| Kommentar zur Kennzahl | Die 75%-Perzentile der gültigen OP-Dauer-Angaben der Operationen aus dem Leistungsbereich „Koronarchirurgie, isoliert“ beruht auf dem BQS-Bundesdatenpool 2006 und ist x min | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. Die Vorjahresergebnisse wurden mit den 75%-Perzentil-Werten der OP-Dauer-Verteilung 2006 berechnet. | | |

Postoperative Retentionsstörung

| | |
|--|---|
| Definition Qualitätsindikator | |
| Laufende Nummer Indikator | 3 |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Postoperative Retentionsstörung |
| Qualitätsziel | Seltenes Auftreten einer postoperativen Nierenfunktionsstörung |
| Indikatortyp | Ergebnisindikator |
| Rationale | <p>Herzchirurgische Operationen werden überwiegend unter Verwendung der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt.</p> <p>Während der extrakorporalen Zirkulation kommt es zu einer Maldistribution des renalen Blutflusses und einer Erhöhung des renalen vaskulären Widerstands. Renaler Blutfluss und glomeruläre Filtrationsrate nehmen ab. Diese Veränderungen können zu einer postoperativen Nierenfunktionsstörung führen.</p> <p>Insbesondere sind Patienten in höherem Lebensalter (> 70 Jahre), Patienten mit präoperativer Herzinsuffizienz, insulinpflichtigem Diabetes mellitus und präexistierender Nierenerkrankung gefährdet.</p> <p>Die Letalität ist bei Patienten mit postoperativer Nierenfunktionsstörung deutlich erhöht. Sie beträgt 19% gegenüber 0,9% bei Patienten ohne renale Komplikationen und steigt bis auf 63%, wenn eine Dialysebehandlung erforderlich wird (Mangano et al. 1998).</p> <p>In der Leitlinie der American Heart Association werden keine prophylaktischen oder therapeutischen Maßnahmen genannt, die die Rate an postoperativen Nierenfunktionsstörungen günstig beeinflussen können (ACC/AHA Guidelines for Coronary Artery Bypass Grafting, Eagle et al. 2004).</p> <p>In die Bewertung der Ergebnisse zu diesem Qualitätsindikator gingen ausschließlich Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ein, die präoperativ unauffällige Retentionsparameter (Kreatinin \leq 1,4 mg/dl oder \leq 124 μmol/l) aufwiesen.</p> |
| Literaturverzeichnis | <p>Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, Edwards FH, Ewy GA, Gardner TJ, Hart JC, Herrmann HC, Hillis LD, Hutter AM, Jr., Lytle BW, Marlow RA, Nugent WC, Orszulak TA. ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery). Circulation 2004; 110 (14): e340-e437.</p> <p>Mangano CM, Diamondstone LS, Ramsay JG, Aggarwal A, Herskowitz A, Mangano DT. Renal Dysfunction after Myocardial Revascularization: Risk Factors, Adverse Outcomes, and Hospital Resource Utilization. Ann Intern Med 1998; 128: 194-203.</p> |

47907

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------|----------|------------|------------------------------------|--|-------------|------|-----------------------------------|--|--------------------|------|-----------------------------------|--|--------------------|------------|------------------------------------|--|----------------|------|---------------------|--|----------|------|---------------|---|---------------|------------|--|--------------------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|------------------------------|--|----------------|-----------|----------------|--------------------|----------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------------------|----------|------------------|
| ID-Kennzahl | 47907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | <= 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | <= 7% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Für die Festlegung des Referenzbereichs wurden die Ergebnisse einer prospektiv randomisierten Multicenterstudie herangezogen (Mangano et al. 1998). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten mit postoperativ neu aufgetretener Dialysepflicht oder mit einer Differenz des Kreatininwertes post- zu präoperativ von $\geq 0,7$ mg/dl und einem postoperativen Kreatininwert von $> 200 \mu\text{mol/l}$ ($> 2,3$ mg/dl) Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden und mit einer gültigen Angabe zum präoperativen Kreatininwert von $\leq 124 \mu\text{mol/l}$ ($\leq 1,4$ mg/dl) sowie einer gültigen Angabe zum postoperativen Kreatininwert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:3 2</td> <td>Kreatininwert i. S. (postoperativ)</td> <td></td> <td>POSTOPKREAT</td> </tr> <tr> <td>I:74</td> <td>Kreatininwert i. S. (präoperativ)</td> <td></td> <td>KREATININWERTM GDL</td> </tr> <tr> <td>I:75</td> <td>Kreatininwert i. S. (präoperativ)</td> <td></td> <td>KREATININWERTM OLL</td> </tr> <tr> <td>III:3 3</td> <td>Kreatininwert i. S. (postoperativ)</td> <td></td> <td>ANDPOSTOPKREAT</td> </tr> <tr> <td>II:3</td> <td>OP-Protokoll Nummer</td> <td></td> <td>OPNUMMER</td> </tr> <tr> <td>II:8</td> <td>Dringlichkeit</td> <td>1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio)</td> <td>DRINGLICHKEIT</td> </tr> <tr> <td>III:3 4</td> <td>postoperativ neu aufgetretene Dialysepflicht</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>POSTOPDIALYSEPF LICHT</td> </tr> <tr> <td>II: 34</td> <td>Koronarchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>KORONARCHIRURG IE</td> </tr> <tr> <td>II: 35</td> <td>Aortenklappenchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II: 74</td> <td>Mitralklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>MITRALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II: 36</td> <td>sonstige Operation am Herzen</td> <td>0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation</td> <td>HERZOPSONSTIGE</td> </tr> <tr> <td>II: 89</td> <td>Pulmonalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PULMONALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II: 82</td> <td>Trikuspidalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>TRICUSPIDALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II: 96</td> <td>Aortenaneurysma/Ektasie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENANEURYSMA</td> </tr> <tr> <td>II:</td> <td>Kongenitale Vitien</td> <td>0 = nein</td> <td>VITIENKONGENITAL</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:3 2 | Kreatininwert i. S. (postoperativ) | | POSTOPKREAT | I:74 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM GDL | I:75 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM OLL | III:3 3 | Kreatininwert i. S. (postoperativ) | | ANDPOSTOPKREAT | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | III:3 4 | postoperativ neu aufgetretene Dialysepflicht | 0 = nein 1 = ja | POSTOPDIALYSEPF LICHT | II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURG IE | II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | II: | Kongenitale Vitien | 0 = nein | VITIENKONGENITAL |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:3 2 | Kreatininwert i. S. (postoperativ) | | POSTOPKREAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:74 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM GDL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:75 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM OLL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:3 3 | Kreatininwert i. S. (postoperativ) | | ANDPOSTOPKREAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:3 4 | postoperativ neu aufgetretene Dialysepflicht | 0 = nein 1 = ja | POSTOPDIALYSEPF LICHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURG IE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: | Kongenitale Vitien | 0 = nein | VITIENKONGENITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | 115 | | 1 = ja | |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRAN KUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

Neurologische Komplikationen

| | |
|--|---|
| Definition Qualitätsindikator | |
| Laufende Nummer Indikator | 4 |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Neurologische Komplikationen |
| Qualitätsziel | Seltenes Auftreten einer postoperativen zerebrovaskulären Komplikation (TIA, Krampf, Parese, Plegie oder Koma) |
| Indikatortyp | Ergebnisindikator |
| Rationale | <p>Postoperative neurologische Komplikationen werden unterteilt in Typ 1- und Typ 2- Defizite.</p> <p>Unter dem Begriff Typ 1-Defizit versteht man größere fokale Schädigungen, die sich klinisch als TIA oder Apoplex sowie Stupor und Koma äußern können.</p> <p>Das Typ 2-Defizit beschreibt eine eher diffuse globale zerebrale Schädigung mit konsekutiver postoperativer Verschlechterung der intellektuellen und kognitiven Fähigkeiten sowie ein postoperatives Durchgangssyndrom.</p> <p>Bei der Betrachtung des Qualitätsindikators werden ausschließlich Typ 1-Defizite ausgewertet, da diese aufgrund ihres eindeutigen klinischen Bildes in der vergleichenden Qualitätsdarstellung besser abgebildet werden können.</p> <p>Typ 1-Defizite treten in bis zu 3,8% aller Patienten nach Koronarchirurgischen Eingriffen auf, sind verantwortlich für 21% aller Todesfälle bei koronarchirurgischen Eingriffen und für 11 zusätzliche Behandlungstage auf der Intensivstation und verdoppeln die Krankenhausaufenthaltsdauer. Zusätzlich besteht gegenüber Patienten ohne diese Komplikation ein sechsfach erhöhtes Risiko für die Verlegung in ein Pflegeheim (Roach et al. 1996).</p> <p>Als Risikofaktoren für postoperative Typ 1-Defizite gelten ein Patientenalter über 70 Jahre, die Atherosklerose der proximalen Aorta, die Dauer der extrakorporalen Zirkulation, präoperativ bestehende neurologische Defizite, der Diabetes mellitus und die arterielle Hypertonie. Aber auch Patienten, bei denen postoperativ die Implantation einer intraortalen Ballonpumpe erforderlich ist, sowie Patienten mit bestehender Stenose der Arteria carotis interna tragen ein erhöhtes Risiko, postoperativ einen Schlaganfall zu erleiden (ACC/AHA Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Eagle et al. 2004).</p> |
| Literaturverzeichnis | <p>Bucerius J, Gummert JF, Borger MA, Walther T, Doll N, Onnasch JF, Metz S, Falk V, Mohr FW. Stroke after cardiac surgery: a risk factor analysis of 16.184 consecutive adult patients. Ann Thorac Surg 2003; 75 (2): 472-478.</p> <p>Hogue CW, Jr., Murphy SF, Schechtman KB, Davila-Roman VG. Risk factors for early or delayed stroke after cardiac surgery. Circulation 1999; 100 (6): 642-647.</p> <p>Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, Edwards FH, Ewy GA, Gardner TJ, Hart JC, Herrmann HC, Hillis LD, Hutter AM, Jr., Lytle BW, Marlow RA, Nugent WC, Orszulak TA. ACC/AHA 2004 guideline update for coronary artery bypass graft surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery). Circulation 2004; 110 (14): e340-e437.</p> <p>Hogue CW, Jr., Murphy SF, Schechtman KB, Davila-Roman VG. Risk factors for early or delayed stroke after cardiac surgery. Circulation 1999; 100 (6): 642-647.</p> <p>McKhann GM, Grega MA, Borowicz LM, Jr., Bechamps M, Selnes OA, Baumgartner WA, Royall RM. Encephalopathy and stroke after coronary artery bypass grafting: incidence, consequences, and prediction. Arch Neurol 2002; 59 (9): 1422-1428.</p> <p>Roach GW, Kanchuger M, Mora Mangano C, Nweman M, Nussmeier N, Wolman R, Aggarwal A, Marshall K, Graham SH, Ley C, Ozanne G, Mangano DT. Adverse Cerebral Outcomes after Coronary Bypass Surgery. N Engl J Med 1996; 335 (25): 1857-1863.</p> <p>Stamou SC, Hill PC, Dangas G, Pfister AJ, Boyce SW, Dillum MK, Bafi AS, Corso PJ. Stroke after coronary artery bypass: incidence, predictors, and clinical outcome. Stroke 2001; 32 (7): 1508-1513.</p> |

47916

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------|-------------|-----------|----------|------------|----------------|---|-----------------------|------|------------------------------|--|----------------------------|------|-----------------------------|--|--------|------|---------------|---|---------------|------|---------------------|--|----------|-----|------------------|----------|----------------|
| ID-Kennzahl | 47916 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | bei Patienten ohne neurologische Vorerkrankungen und Dauer des zerebrovaskulären Ereignisses zwischen > 24 h bis <= 72 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich wurde für Patienten mit postoperativen neurologischen Komplikationen, deren klinische Symptomatik länger als 72 Stunden andauerte, festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | <p>Zähler: Patienten mit postoperativem zerebrovaskulärem Ereignis bis zur Entlassung mit einer Dauer von > 24 h bis <= 72 h</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden ohne neurologische Vorerkrankung bzw. ohne nachweisbarem präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:2 6</td> <td>wenn ja: Dauer</td> <td>1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden</td> <td>CEREBROEREIGNIS DAUER</td> </tr> <tr> <td>I:71</td> <td>neurologische Erkrankung(en)</td> <td>0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt</td> <td>NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN</td> </tr> <tr> <td>I:72</td> <td>Schweregrad der Behinderung</td> <td>0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig</td> <td>RANKIN</td> </tr> <tr> <td>II:8</td> <td>Dringlichkeit</td> <td>1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio)</td> <td>DRINGLICHKEIT</td> </tr> <tr> <td>II:3</td> <td>OP-Protokoll Nummer</td> <td></td> <td>OPNUMMER</td> </tr> <tr> <td>II:</td> <td>Koronarchirurgie</td> <td>0 = nein</td> <td>KORONARCHIRURG</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:2 6 | wenn ja: Dauer | 1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden | CEREBROEREIGNIS DAUER | I:71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN | I:72 | Schweregrad der Behinderung | 0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig | RANKIN | II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | II: | Koronarchirurgie | 0 = nein | KORONARCHIRURG |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:2 6 | wenn ja: Dauer | 1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden | CEREBROEREIGNIS DAUER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:72 | Schweregrad der Behinderung | 0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig bzw. rollstuhlpflichtig | RANKIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II: | Koronarchirurgie | 0 = nein | KORONARCHIRURG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------|
| | 34 | | 1 = ja | IE |
| | II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

47917

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------|-------------|-----------|----------|------------|----------------|---|-----------------------|------|------------------------------|--|----------------------------|------|-----------------------------|--|--------|
| ID-Kennzahl | 47917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | bei Patienten ohne neurologische Vorerkrankungen und Dauer des zerebrovaskulären Ereignisses > 72 h | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | <= x% (95%-Perzentile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | <= 2,6% (95%-Perzentile) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Der Vergleich mit Daten aus der wissenschaftlichen Literatur ist deutlich eingeschränkt, da in der BQS-Bundesauswertung wesentliche Risikofaktoren, wie z.B. Notfalleingriffe, die simultane Karotisrekonstruktion oder Patienten mit vorbestehendem neurologischen Defizit von der Grundgesamtheit ausgeschlossen werden. Zusätzlich sind neurologische Komplikationen in den wissenschaftlichen Publikationen unterschiedlich definiert. Während einige Autoren hierunter jedes zerebrovaskuläre Ereignis nach herzchirurgischen Operationen verstehen (Roach et al. 1996, Bucerius et al. 2003), werden in anderen Publikationen nur solche Schlaganfälle erfasst, bei denen die klinische Symptomatik länger als 24 Stunden (McKhann et al. 2002) bzw. 72 Stunden (Hogue, Jr. et al. 1999, Stamou et al. 2001) anhält. Daher hat die Fachgruppe eine Perzentile als Referenzbereich zu diesem Indikator festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten mit postoperativem zerebrovaskulärem Ereignis bis zur Entlassung mit einer Dauer von > 72 h Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden und ohne neurologische Vorerkrankung bzw. ohne nachweisbarem präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:2 6</td> <td>wenn ja: Dauer</td> <td>1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden</td> <td>CEREBROEREIGNIS DAUER</td> </tr> <tr> <td>I:71</td> <td>neurologische Erkrankung(en)</td> <td>0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt</td> <td>NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN</td> </tr> <tr> <td>I:72</td> <td>Schweregrad der Behinderung</td> <td>0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig</td> <td>RANKIN</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:2 6 | wenn ja: Dauer | 1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden | CEREBROEREIGNIS DAUER | I:71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN | I:72 | Schweregrad der Behinderung | 0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig | RANKIN |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III:2 6 | wenn ja: Dauer | 1 = bis einschl. 24 Stunden 2 = mehr als 24 Stunden bis einschl. 72 Stunden 3 = über 72 Stunden | CEREBROEREIGNIS DAUER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHEE RKRANKUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I:72 | Schweregrad der Behinderung | 0 = Rankin 0: Kein neurologisches Defizit nachweisbar 1 = Rankin 1: Apoplex mit funktionell irrelevantem neurologischen Defizit 2 = Rankin 2: Leichter Apoplex mit funktionell geringgradigem Defizit und / oder leichter Aphasie 3 = Rankin 3: Mittelschwerer Apoplex mit deutlichem Defizit mit erhaltener Gehfähigkeit und / oder mittelschwerer Aphasie 4 = Rankin 4: Schwerer Apoplex, Gehen nur mit Hilfe möglich und / oder komplette Aphasie 5 = Rankin 5: Invalidisierender Apoplex: Patient ist bettlägerig | RANKIN | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | | bzw. rollstuhlpflichtig | |
| | II:8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja | HERZOPSONSTIGE |
| | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

Letalität

| | |
|--------------------------------------|--|
| Definition Qualitätsindikator | |
| Laufende Nummer Indikator | 5 |
| Bezeichnung des Qualitätsindikators | Letalität |
| Qualitätsziel | Möglichst geringe Letalität: In-Hospital-Letalität 30-Tage-Letalität Risikoadjustierte 30-Tage-Letalität |
| Indikatortyp | Ergebnisindikator |
| Rationale | <p>Die Untersuchung der perioperativen Letalität gehört zum Standard bei der Betrachtung von postoperativen Komplikationen. Die In-Hospital-Letalität erfasst alle Patienten, die während des gleichen stationären Aufenthaltes im Krankenhaus versterben, ohne Angaben zum jeweiligen Todeszeitpunkt. Aussagen zur Ergebnisqualität eines Krankenhauses sind jedoch nur unter Berücksichtigung der Tatsache möglich, dass Patienten nicht erfasst werden, die frühzeitig in ein anderes Krankenhaus verlegt werden und dann dort versterben.</p> <p>Daher wird in der Literatur neben der In-Hospital-Letalität häufig auch die 30-Tage-Letalität angegeben.</p> <p>Die 30-Tage-Letalität wird jedoch nicht allein von der Qualität der erbrachten Leistung beeinflusst. Die medizinischen und pflegerischen Ergebnisse hängen auch davon ab, welches Risikoprofil die in der Abteilung behandelten Patienten aufweisen. In der wissenschaftlichen Literatur erfolgt daher häufig die Angabe einer risikoadjustierten 30-Tages-Letalitätsrate. Hierzu wird im europäischen Raum der logistische oder additive EuroSCORE verwendet. Dieser Risikoscore wurde anhand der Daten von 19.030 Patienten aus acht europäischen Ländern entwickelt, die sich im Jahr 1995 einem herzchirurgischen Eingriff unterziehen mussten. Dabei wurden 17 Risikofaktoren identifiziert, die Einfluss auf die Letalität nach herzchirurgischen Operationen haben können (Roques et al. 1999). Anhand dieser Einflussgrößen kann für jedes Patientenkollektiv eine statistisch zu erwartende Letalitätsrate ermittelt werden, die der tatsächlich beobachteten Letalitätsrate gegenübergestellt werden kann. Dadurch erhalten die Krankenhäuser eine spezifischere Rückmeldung über die Qualität ihrer Behandlung.</p> <p>Die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalitätsrate der deutschen Krankenhäuser lag in den Jahren 2002 und 2003 im Leistungsbereich „isolierte Koronarchirurgie“ mit 4,80% bzw. 5,34% (www.bqs-outcome.de) deutlich über der in der ursprünglichen Publikation angegebenen Rate von 3,4% (Roques et al. 1999), d. h., das Risikoprofil der behandelten Patienten hat im Vergleich zur ursprünglichen EuroSCORE-Population erheblich zugenommen. Gleichzeitig wurde mit 3,26% bzw. 3,27% eine etwas niedrigere 30-Tage-Letalitätsrate als von Roques et al. publiziert beobachtet. Zingone et al. (Zingone et al. 2004) haben in einer Untersuchung am eigenen Patientenkollektiv ein ähnliches Phänomen beobachtet. Über einen Zeitraum von fünf Jahren veränderte sich die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalität nur unwesentlich. Allerdings nahm die tatsächlich beobachtete Letalitätsrate deutlich ab. Bezogen auf die klinische Praxis sind sowohl die Abnahme der Letalitätsrate bei nahezu unverändertem Risikoprofil der behandelten Patienten als auch eine gleich bleibende Letalitätsrate bei zunehmender Anzahl von Risikopatienten im zeitlichen Verlauf Ausdruck einer Zunahme der Behandlungsqualität.</p> <p>Die vergleichende Darstellung der nach dem logistischen EuroSCORE adjustierten In-Hospital-Letalität in der BQS-Bundesauswertung 2004 zeigt, dass nahezu alle herzchirurgischen Abteilungen bessere Ergebnisse erzielen, als nach dem EuroSCORE zu erwarten wäre. Aus diesem Grund hat die BQS gemeinsam mit der Fachgruppe Herzchirurgie ein neues Modell zur Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität in der isolierten Koronarchirurgie entwickelt, das Fortschritte in der Behandlungsqualität der herzchirurgischen Krankenhäuser angemessener berücksichtigt. Die Krankenhäuser erhalten so für das interne Qualitätsmanagement ein Instrument, das spezifischere Anreize zur Qualitätsverbesserung setzt. Gleichzeitig kann der Strukturierte Dialog mit auffälligen Krankenhäusern im Rahmen der externen vergleichenden Qualitätssicherung ebenfalls spezifischer geführt werden.</p> |

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>Literaturverzeichnis</p> | <p>Roques F, Nashef SAM, Michel P, Gauducheau E, de Vincentiis C, Baudet E, Cortina J, David M, Faichney A, Gavrielle F, Gams E, Harjula A, Jones MT, Pinna Pintor P, Salamon R, Thulin L. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. <i>European Journal of Cardio-Thoracic Surgery</i> 1999; (15): 816-823.</p> <p>Zingone B, Pappalardo A, Dreas L. Logistic versus additive EuroSCORE. A comparative assessment of the two models in an independent population sample. <i>European Journal of Cardio-Thoracic Surgery</i> 2004; 26: 1134-1140.</p> |
|-----------------------------|---|

28269

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|------|-------------|-----------|----------|------------|------------------|---|-----------|
| ID-Kennzahl | 28269 | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Seit 2005 steht ein von der BQS und der BQS-Fachgruppe Herzchirurgie gemeinsam entwickeltes komplexes statistisches Modell zur Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität in der isolierten Koronarchirurgie zur Verfügung (logistischer KCH-SCORE). Das Risikoprofil der behandelten Patienten wird in diesem Risikoscore differenziert abgebildet, so dass die BQS-Fachgruppe Herzchirurgie auf die Festlegung eines Referenzbereichs für die nicht adjustierte In-Hospital-Letalitätsrate verzichtet hat. | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Keine Risikoadjustierung erforderlich | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstarben Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:6 2</td> <td>Entlassungsgrund</td> <td>01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen</td> <td>ENTLGRUND</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen | ENTLGRUND |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | |
| III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen | ENTLGRUND | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------|
| | | | der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG 18 = Rückverlegung 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation 21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme | |
| | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja | HERZOPSONSTIGE |
| | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| | Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

70419

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|------|-------------|-----------|----------|------------|------------------|---|-----------|
| ID-Kennzahl | 70419 | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | In-Hospital-Letalität bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Seit 2005 steht ein von der BQS und der BQS-Fachgruppe Herzchirurgie gemeinsam entwickeltes komplexes statistisches Modell zur Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität in der isolierten Koronarchirurgie zur Verfügung (logistischer KCH-SCORE). Das Risikoprofil der behandelten Patienten wird in diesem Risikoscore differenziert abgebildet, so dass die BQS-Fachgruppe Herzchirurgie auf die Festlegung eines Referenzbereichs für die In-Hospital-Letalität von Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation verzichtet hat. | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstarben Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich isoliert koronarchirurgisch operiert wurden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:6 2</td> <td>Entlassungsgrund</td> <td>01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen</td> <td>ENTLGRUND</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen | ENTLGRUND |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | |
| III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen | ENTLGRUND | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--|----------------------|
| | | | der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG 18 = Rückverlegung 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation 21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme | |
| | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| | II: 8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| | II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| | II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja | HERZOPSONSTIGE |
| | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| | Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

28272

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|------|-------------|-----------|----------|------------|------------------|---|-----------|
| ID-Kennzahl | 28272 | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | In-Hospital-Letalität bei Patienten mit Notfall- oder Notfall(Reanimation/ultima ratio)-Operationen | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich wurde für die nach dem logistischen KCH-SCORE adjustierte In-Hospital-Letalitätsrate festgelegt. | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Stratifizierung | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstarben Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation als Notfall oder als Notfall (Reanimation/ultima ratio) isoliert koronarchirurgisch operiert wurden | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>III:6 2</td> <td>Entlassungsgrund</td> <td>01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung</td> <td>ENTLGRUND</td> </tr> </tbody> </table> | | | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung | ENTLGRUND |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | |
| III:6 2 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung | ENTLGRUND | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | | 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG 18 = Rückverlegung 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation 21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme | |
| | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| | II: 8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| | II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| | II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |

66755

| | |
|--|--|
| Definition Kennzahl | |
| ID-Kennzahl | 66755 |
| Ergänzung Bezeichnung QI | Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität nach logistischem KCH-SCORE |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Logistische Regression |
| Rechenregel | <p>O / E</p> <p><u>O (observed) ist die beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) mit:</u></p> <p>Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>E (expected) ist die erwartete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) nach logistischem KCH-SCORE und wird berechnet als</u></p> <p>Mittelwert des KCH-SCORE mit der</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> |

Erläuterung der Rechenregel

KCH-SCORE:

| Risikofaktor | Regressionskoeffizient | Standardfehler | p-Wert | Odds-Ratio |
|--|------------------------|----------------|--------|------------|
| Konstante | -5,276 | 0,077 | <0,001 | |
| Alter 66 - 80 Jahre | 0,743 | 0,070 | <0,001 | 2,10 |
| Alter > 80 Jahre | 1,490 | 0,104 | <0,001 | 4,44 |
| Geschlecht weiblich | 0,398 | 0,061 | <0,001 | 1,49 |
| Präoperativer Kreatininwert | 0,790 | 0,119 | <0,001 | 2,20 |
| Extrakardiale Arteriopathie | 0,504 | 0,063 | <0,001 | 1,66 |
| Chronische Lungenerkrankungen | 0,463 | 0,090 | <0,001 | 1,59 |
| Neurologische Dysfunktion | 0,250 | 0,092 | 0,007 | 1,28 |
| Reoperation (frühere Herzoperationen) | 0,973 | 0,097 | <0,001 | 2,65 |
| Kritischer präoperativer Status | 0,952 | 0,083 | <0,001 | 2,59 |
| LVEF 30 - 50% | 0,447 | 0,064 | <0,001 | 1,56 |
| LVEF < 30% | 0,860 | 0,081 | <0,001 | 2,36 |
| Kürzlicher Myokardinfarkt | 0,423 | 0,060 | <0,001 | 1,53 |
| Pulmonale Hypertonie | 0,760 | 0,119 | <0,001 | 2,14 |
| Notfall | 0,951 | 0,072 | <0,001 | 2,59 |
| Diabetes mellitus (Insulinpflichtig) | 0,306 | 0,073 | <0,001 | 1,36 |
| Vorhofflimmern oder andere Rhythmusstörungen | 0,521 | 0,078 | <0,001 | 1,68 |

Tabelle 1: Ergebnis der multiplen logistischen Regression

Der Mittelwert des KCH-SCORE wird auf Patientenbasis berechnet. Es lässt sich für jeden Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE seine individuell erwartete Wahrscheinlichkeit berechnen, nach einem isoliert koronarchirurgischen Eingriff zu versterben. Dabei wird der Zustand des Patienten bezüglich aller in der Tabelle aufgelisteten Risikofaktoren berücksichtigt. Dieser KCH-SCORE-Wert berechnet sich dabei folgendermaßen:

Ausgehend vom logistischen Regressionsmodell

$$\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n$$

mit den Risikofaktoren x_1, \dots, x_n (hier mit den Werten '1' bei Vorliegen und '0' bei Nicht-Vorliegen), der Konstanten β_0 und den Regressionskoeffizienten β_1, \dots, β_n lässt sich die Wahrscheinlichkeit p , nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, nun für jeden Patienten mit vollständigen Angaben zu den 14 Risikofaktoren unter Berücksichtigung seiner individuellen Risikostruktur berechnen:

$$p = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)}$$

So beträgt die erwartete Wahrscheinlichkeit, nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff in einem deutschen Krankenhaus zu versterben, für eine 68-jährige weibliche Patientin mit präoperativem Kreatininwert > 2,3 mg/dl und LVEF von 30

bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren

$$p = \frac{\exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447)}{1 + \exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447)} = \frac{\exp(-2,898)}{1 + \exp(-2,898)}$$
$$= \frac{0,055}{1,055} = 0,052 = 5,2\%.$$

Bei zusätzlich beobachtetem insulinpflichtigen Diabetes mellitus erhöht sich diese auf

$$p = \frac{\exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447 + 0,306)}{1 + \exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447 + 0,306)} = \frac{\exp(-2,592)}{1 + \exp(-2,592)}$$
$$= \frac{0,075}{1,075} = 0,070 = 7,0\%.$$

| | | | | |
|------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| | <u>KCH-SCORE-Tabelle</u> | | KCH-SCORE-Wert (Patient) | erwartete Letalität (Patient) |
| | <p>Zur Abschätzung des Risikos eines Patienten mittels KCH-SCORE kann auch die nebenstehende Tabelle verwendet werden. Dazu werden für alle bei einem Patienten auftretenden Risikofaktoren die Werte der in Tabelle 1 angegebenen Regressionskoeffizienten aufaddiert, um den entsprechenden Wert des KCH-SCORE zu erhalten. Das prozentuale Risiko eines Patienten, nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, lässt sich dann in der nebenstehenden Tabelle ablesen.</p> <p>Betrachtet man wiederum eine 68-jährige weibliche Patientin mit präoperativem Kreatininwert > 2,3 mg/dl und LVEF von 30 bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren, so erhält man einen KCH-SCORE-Wert von 2,378 (= 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447). Für diese Patientin liegt das erwartete Risiko zu versterben zwischen 4,63% und 5,86%.</p> <p>Bei zusätzlich beobachtetem insulinpflichtigen Diabetes mellitus erhöht sich der KCH-SCORE-Wert um 0,306 auf 2,684. In der Tabelle lässt sich damit eine erwartete Letalität ablesen, die zwischen 5,86% und 7,41% liegt.</p> | | 0,00 | 0,51% |
| | | | 0,25 | 0,65% |
| | | | 0,50 | 0,84% |
| | | | 0,75 | 1,07% |
| | | | 1,00 | 1,37% |
| | | | 1,25 | 1,75% |
| | | | 1,50 | 2,24% |
| | | | 1,75 | 2,86% |
| | | | 2,00 | 3,64% |
| | | | 2,25 | 4,63% |
| | | | 2,50 | 5,86% |
| | | | 2,75 | 7,41% |
| | | | 3,00 | 9,31% |
| | | | 3,25 | 11,65% |
| | | | 3,50 | 14,48% |
| | | | 3,75 | 17,86% |
| | | | 4,00 | 21,82% |
| | | | 4,25 | 26,39% |
| | | | 4,50 | 31,52% |
| | | | 4,75 | 37,15% |
| | | | 5,00 | 43,14% |
| | | | 5,25 | 49,35% |
| | | | 5,50 | 55,58% |
| | | | 5,75 | 61,63% |
| | | | 6,00 | 67,35% |
| 6,25 | | | 72,59% | |
| 6,50 | 77,28% | | | |
| 6,75 | 81,37% | | | |
| 7,00 | 84,86% | | | |
| 7,25 | 87,80% | | | |
| 7,50 | 90,24% | | | |
| 7,75 | 92,23% | | | |
| 8,00 | 93,84% | | | |
| 8,25 | 95,14% | | | |
| 8,50 | 96,17% | | | |
| 8,75 | 96,99% | | | |
| 9,00 | 97,64% | | | |
| 9,25 | 98,15% | | | |
| 9,50 | 98,56% | | | |
| 9,75 | 98,87% | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---|--------------|
| Verwendete Datenfelder | Feldnamen 9.0: | | | |
| | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname |
| | I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM |
| | I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT |
| | I: 12 | führender Rhythmus bei Aufnahme | 1 = Sinusrhythmus 2 = Vorhofflimmern 8 = andere Rhythmusstörungen | AUFNRHYTHMUS |
| I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der | AUFNBEFUNDINFA | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | <p>letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | RKT |
| I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | <p>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDSCHO CKKARDIOGEN |
| I: 18 | Reanimation | <p>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDREAN IMATION |
| I: 19 | Patient wird beatmet | <p>0 = nein 1 = ja</p> | AUFNBEFUNDBEAT MUNG |
| I: 22 | pulmonale Hypertonie | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDHYPE RTONIEPULMONAL |
| I: 23 | Diabetes mellitus | <p>0 = nein 1 = ja, diätetisch behandelt 2 = ja, orale Medikation 3 = ja, mit Insulin behandelt 4 = ja, unbehandelt 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDIAB ETES |
| I: 29 | Inotrope (i. v.) | <p>0 = nein 1 = ja</p> | INOTROPEIV |
| I: 37 | LVEF | <p>1 = schlecht oder < 30% 2 = mittel oder 30% - 50% 3 = gut oder > 50%</p> | LVEF |
| I: 47 | Anzahl | | VOROPANZAHL |
| I: 51 | Koronarchirurgie | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPKORONARC HIRURGIE |
| I: 52 | Aortenklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPAORTENKLA PPE |
| I: 53 | Mitralklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPMITRALKLA PPE |
| I: 54 | Trikuspidalklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPTRICUSPIDA LKLAFFE |
| I: 55 | Pulmonalklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPPULMONALK LAPPE |
| I: 56 | Aortenaneurysma / - | <p>0 = nein</p> | VOROPAORTENAN |

| | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------------|
| | | ektasie | 1 = ja, thorakal 3 = ja, Kombination 9 = unbekannt | EURYSMA |
| I: 57 | | kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPVITIENKONGENITAL |
| I: 58 | | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZTUMOR |
| I: 59 | | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPERIKARDERKRANKUNG |
| I: 60 | | Transplantation | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRANSPLANTATION |
| I: 61 | | Rhythmuschirurgie | 0 = nein 1 = ja, epikardiale Schrittmacher-Implantation 2 = ja, epikardiale Defibrillator-Implantation 3 = ja, Kombination 4 = ja, antitachykarde OP 8 = ja, andere 9 = unbekannt | VOROPRHYTHMUSCHIRURGIE |
| I: 62 | | sonstige Herz-Vor-OP | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZSONSTIGE |
| I: 65 | | arterielle Gefäßerkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVK |
| I: 66 | | periphere AVK (Extremitäten) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKPERIPHER |
| I: 67 | | zum Hirn führende Gefäße | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKHIRNVERSORGEND |
| I: 68 | | Aortenaneurysma | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKAORTENANEURYSMA |
| I: 69 | | sonstige arterielle Gefäßerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKSONSTIGE |
| I: 70 | | Lungenerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, COPD mit Langzeit-Bronchodilatoren-Therapie 2 = ja, andere ohne Langzeit-Bronchodilatoren-Therapie 8 = ja, andere 9 = unbekannt | LUNGENERKRANKUNGEN |
| I: 71 | | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN |
| I: 74 | | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMGDL |
| I: 75 | | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMOLL |
| II: 3 | | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| II: 8 | | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich | DRINGLICHKEIT |

| | | | | |
|--|------------|--|---|-----------------------------|
| | | | 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | |
| | II: 10 | (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung | 0 = nein 1 = ja, IABP 2 = ja, Kreislumpumpe 3 = ja, anderes Assist Device 4 = ja, ECMO | KREISLAUFUNTERS TUETZUNG |
| | II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURG IE |
| | II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| | II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAP PE |
| | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYS MA |
| | II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRAN KUNGEN |
| | III: 62 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, | ENTLGRUND |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung</p> <p>17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG</p> <p>18 = Rückverlegung</p> <p>19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung</p> <p>20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation</p> <p>21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme</p> | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | <p>Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar.</p> <p>Die Kennzahl 66755 ist identisch mit der Vorjahreskennzahl 69232. Eine Umstellung erfolgte hier aus rein rechentechnischen Erwägungen.</p> | | | |

66781

| | |
|--|---|
| Definition Kennzahl | |
| ID-Kennzahl | 66781 |
| Ergänzung Bezeichnung QI | Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem KCH-SCORE |
| Referenzbereich 2006 | <= x% (95%-Perzentile) |
| Referenzbereich 2005 | <= 6,4% (95%-Perzentile) |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | In der wissenschaftlichen Literatur zur Letalität nach koronarchirurgischen Operationen kommen unterschiedliche Risikoadjustierungsmodelle zur Anwendung, bei denen sowohl die einbezogenen Risikofaktoren als auch der relative Einfluss dieser Risikofaktoren variieren. Ein fester Referenzbereich zur risikoadjustierten In-Hospital-Letalität nach dem logistischen KCH-SCORE lässt sich nach Auffassung der BQS-Fachgruppe Herzchirurgie aus diesen Publikationen nicht ableiten. Daher hat die Fachgruppe eine Perzentile als Referenzbereich zu diesem Qualitätsindikator festgelegt. |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Logistische Regression |
| Rechenregel | <p>$(O / E) * O_{\text{Gesamt}}$</p> <p><u>O (observed)</u> ist die beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) mit:</p> <p>Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>E (expected)</u> ist die erwartete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) nach logistischem KCH-SCORE und wird berechnet als</p> <p>Mittelwert des KCH-SCORE mit der</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>O_{Gesamt}</u> ist die bundesweit beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität)</p> <p>Zähler: Patienten, die bundesweit im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE, die bundesweit in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> |
| Erläuterung der Rechenregel | <u>KCH-SCORE:</u> |

Tabelle 1: Ergebnis der multiplen logistischen Regression

| Risikofaktor | Regressionskoeffizient | Standardfehler | p-Wert | Odds-Ratio |
|--|------------------------|----------------|--------|------------|
| Konstante | -5,276 | 0,077 | <0,001 | |
| Alter 66 - 80 Jahre | 0,743 | 0,070 | <0,001 | 2,10 |
| Alter > 80 Jahre | 1,490 | 0,104 | <0,001 | 4,44 |
| Geschlecht weiblich | 0,398 | 0,061 | <0,001 | 1,49 |
| Präoperativer Kreatininwert | 0,790 | 0,119 | <0,001 | 2,20 |
| Extrakardiale Arteriopathie | 0,504 | 0,063 | <0,001 | 1,66 |
| Chronische Lungenerkrankungen | 0,463 | 0,090 | <0,001 | 1,59 |
| Neurologische Dysfunktion | 0,250 | 0,092 | 0,007 | 1,28 |
| Reoperation (frühere Herzoperationen) | 0,973 | 0,097 | <0,001 | 2,65 |
| Kritischer präoperativer Status | 0,952 | 0,083 | <0,001 | 2,59 |
| LVEF 30 - 50% | 0,447 | 0,064 | <0,001 | 1,56 |
| LVEF < 30% | 0,860 | 0,081 | <0,001 | 2,36 |
| Kürzlicher Myokardinfarkt | 0,423 | 0,060 | <0,001 | 1,53 |
| Pulmonale Hypertonie | 0,760 | 0,119 | <0,001 | 2,14 |
| Notfall | 0,951 | 0,072 | <0,001 | 2,59 |
| Diabetes mellitus (Insulinpflichtig) | 0,306 | 0,073 | <0,001 | 1,36 |
| Vorhofflimmern oder andere Rhythmusstörungen | 0,521 | 0,078 | <0,001 | 1,68 |

Der Mittelwert des KCH-SCORE wird auf Patientenbasis berechnet. Es lässt sich für jeden Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE seine individuell erwartete Wahrscheinlichkeit berechnen, nach einem isoliert koronarchirurgischen Eingriff zu versterben. Dabei wird der Zustand des Patienten bezüglich aller in der Tabelle aufgelisteten Risikofaktoren berücksichtigt. Dieser KCH-SCORE-Wert berechnet sich dabei folgendermaßen:

Ausgehend vom logistischen Regressionsmodell

$$\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n,$$

mit den Risikofaktoren x_1, \dots, x_n (hier mit den Werten '1' bei Vorliegen und '0' bei Nicht-Vorliegen), der Konstanten β_0 und den Regressionskoeffizienten β_1, \dots, β_n lässt sich die Wahrscheinlichkeit p , nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, nun für jeden Patienten mit vollständigen Angaben zu den 14 Risikofaktoren unter Berücksichtigung seiner individuellen Risikostruktur berechnen:

$$p = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)}$$

So beträgt die erwartete Wahrscheinlichkeit, nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff in einem deutschen Krankenhaus zu versterben, für eine 68-jährige weibliche Patientin mit präoperativem Kreatininwert > 2,3 mg/dl und LVEF von 30 bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren

$$p = \frac{\exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447)}{1 + \exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447)} = \frac{\exp(-2,898)}{1 + \exp(-2,898)}$$
$$= \frac{0,055}{1,055} = 0,052 = 5,2\%.$$

Bei zusätzlich beobachtetem insulinpflichtigen Diabetes mellitus erhöht sich diese auf

$$p = \frac{\exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447 + 0,306)}{1 + \exp(-5,276 + 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447 + 0,306)} = \frac{\exp(-2,592)}{1 + \exp(-2,592)}$$
$$= \frac{0,075}{1,075} = 0,070 = 7,0\%.$$

| | | | | |
|------|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| | <u>KCH-SCORE-Tabelle</u> | | KCH-SCORE-Wert (Patient) | erwartete Letalität (Patient) |
| | <p>Zur Abschätzung des Risikos eines Patienten mittels KCH-SCORE kann auch die nebenstehende Tabelle verwendet werden. Dazu werden für alle bei einem Patienten auftretenden Risikofaktoren die Werte der in Tabelle 1 angegebenen Regressionskoeffizienten aufaddiert, um den entsprechenden Wert des KCH-SCORE zu erhalten. Das prozentuale Risiko eines Patienten, nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, lässt sich dann in der nebenstehenden Tabelle ablesen.</p> <p>Betrachtet man wiederum eine 68-jährige weibliche Patientin mit präoperativem Kreatininwert > 2,3 mg/dl und LVEF von 30 bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren, so erhält man einen KCH-SCORE-Wert von 2,378 (= 0,743 + 0,398 + 0,790 + 0,447). Für diese Patientin liegt das erwartete Risiko zu versterben zwischen 4,63% und 5,86%.</p> <p>Bei zusätzlich beobachtetem insulinpflichtigen Diabetes mellitus erhöht sich der KCH-SCORE-Wert um 0,306 auf 2,684. In der Tabelle lässt sich damit eine erwartete Letalität ablesen, die zwischen 5,86% und 7,41% liegt.</p> | | 0,00 | 0,51% |
| | | | 0,25 | 0,65% |
| | | | 0,50 | 0,84% |
| | | | 0,75 | 1,07% |
| | | | 1,00 | 1,37% |
| | | | 1,25 | 1,75% |
| | | | 1,50 | 2,24% |
| | | | 1,75 | 2,86% |
| | | | 2,00 | 3,64% |
| | | | 2,25 | 4,63% |
| | | | 2,50 | 5,86% |
| | | | 2,75 | 7,41% |
| | | | 3,00 | 9,31% |
| | | | 3,25 | 11,65% |
| | | | 3,50 | 14,48% |
| | | | 3,75 | 17,86% |
| | | | 4,00 | 21,82% |
| | | | 4,25 | 26,39% |
| | | | 4,50 | 31,52% |
| | | | 4,75 | 37,15% |
| | | | 5,00 | 43,14% |
| | | | 5,25 | 49,35% |
| | | | 5,50 | 55,58% |
| | | | 5,75 | 61,63% |
| | | | 6,00 | 67,35% |
| | | | 6,25 | 72,59% |
| | | | 6,50 | 77,28% |
| 6,75 | | | 81,37% | |
| 7,00 | 84,86% | | | |
| 7,25 | 87,80% | | | |
| 7,50 | 90,24% | | | |
| 7,75 | 92,23% | | | |
| 8,00 | 93,84% | | | |
| 8,25 | 95,14% | | | |
| 8,50 | 96,17% | | | |
| 8,75 | 96,99% | | | |
| 9,00 | 97,64% | | | |
| 9,25 | 98,15% | | | |
| 9,50 | 98,56% | | | |
| 9,75 | 98,87% | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|---|--------------|
| Verwendete Datenfelder | Feldnamen 9.0: | | | |
| | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname |
| | I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM |
| | I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT |
| | I: 12 | führender Rhythmus bei Aufnahme | 1 = Sinusrhythmus 2 = Vorhofflimmern 8 = andere Rhythmusstörungen | AUFNRHYTHMUS |
| I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der | AUFNBEFUNDINFA | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | RKT |
| I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDSCHO CKKARDIOGEN |
| I: 18 | Reanimation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDREAN IMATION |
| I: 19 | Patient wird beatmet | 0 = nein 1 = ja | AUFNBEFUNDBEAT MUNG |
| I: 22 | pulmonale Hypertonie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDHYPE RTONIEPULMONAL |
| I: 23 | Diabetes mellitus | 0 = nein 1 = ja, diätetisch behandelt 2 = ja, orale Medikation 3 = ja, mit Insulin behandelt 4 = ja, unbehandelt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDIAB ETES |
| I: 29 | Inotrope (i. v.) | 0 = nein 1 = ja | INOTROPEIV |
| I: 37 | LVEF | 1 = schlecht oder < 30% 2 = mittel oder 30% - 50% 3 = gut oder > 50% | LVEF |
| I: 47 | Anzahl | | VOROPANZAHL |
| I: 51 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPKORONARC HIRURGIE |
| I: 52 | Aortenklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPAORTENKLA PPE |
| I: 53 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPMITRALKLA PPE |
| I: 54 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRICUSPIDA LKLAFFE |
| I: 55 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPULMONALK LAPPE |
| I: 56 | Aortenaneurysma / - | 0 = nein | VOROPAORTENAN |

| | | | | |
|-------|--|---|---|----------------------------|
| | | ektasie | 1 = ja, thorakal 3 = ja, Kombination 9 = unbekannt | EURYSMA |
| I: 57 | | kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPVITIENKONGENITAL |
| I: 58 | | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZTUMOR |
| I: 59 | | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPERIKARDERKRANKUNG |
| I: 60 | | Transplantation | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRANSPLANTATION |
| I: 61 | | Rhythmuschirurgie | 0 = nein 1 = ja, epikardiale Schrittmacher-Implantation 2 = ja, epikardiale Defibrillator-Implantation 3 = ja, Kombination 4 = ja, antitachykarde OP 8 = ja, andere 9 = unbekannt | VOROPRHYTHMUSCHIRURGIE |
| I: 62 | | sonstige Herz-Vor-OP | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZSONSTIGE |
| I: 65 | | arterielle Gefäßerkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVK |
| I: 66 | | periphere AVK (Extremitäten) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKPERIPHER |
| I: 67 | | zum Hirn führende Gefäße | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKHIRNVERSORGEND |
| I: 68 | | Aortenaneurysma | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKAORTENANEURYSMA |
| I: 69 | | sonstige arterielle Gefäßerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKSONSTIGE |
| I: 70 | | Lungenerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, COPD mit Langzeit-Bronchodilatoren-Therapie 2 = ja, andere ohne Langzeit-Bronchodilatoren-Therapie 8 = ja, andere 9 = unbekannt | LUNGENERKRANKUNGEN |
| I: 71 | | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN |
| I: 74 | | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMGDL |
| I: 75 | | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMOLL |
| II: 3 | | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| II: 8 | | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich | DRINGLICHKEIT |

| | | | |
|------------|--|---|-----------------------------|
| | | 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | |
| II: 10 | (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung | 0 = nein 1 = ja, IABP 2 = ja, Kreislumpumpe 3 = ja, anderes Assist Device 4 = ja, ECMO | KREISLAUFUNTERS TUETZUNG |
| II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURG IE |
| II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAP PE |
| II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYS MA |
| II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRAN KUNGEN |
| III: 62 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus 07 = Tod 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung) 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung 11 = Entlassung in ein Hospiz 12 = interne Verlegung 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, | ENTLGRUND |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung</p> <p>17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG</p> <p>18 = Rückverlegung</p> <p>19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung</p> <p>20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation</p> <p>21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme</p> | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | <p>Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar.</p> <p>Die Kennzahl 66781 ist identisch mit der Vorjahreskennzahl 69233. Eine Umstellung erfolgte hier aus rein rechentechnischen Erwägungen.</p> | | | |

65560

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|-----------|----------|------|--------------|--|----------|------|------------|------------------------------|------------|-------|------------|--|-------------------|
| ID-Kennzahl | 65560 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität nach logistischem EuroSCORE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | <p>Die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalitätsrate der deutschen Krankenhäuser lag im Jahr 2002 und 2003 im Leistungsbereich Isolierte Koronarchirurgie mit 4,80% bzw. 5,34% (www.bqs-outcome.de) deutlich über der in der ursprünglichen Publikation angegebenen Rate von 3,4% (Roques et al. 1999), d.h. das Risikoprofil der behandelten Patienten hat im Vergleich zur ursprünglichen EuroSCORE-Population erheblich zugenommen. Gleichzeitig wurde mit 3,26% bzw. 3,27% eine etwas niedrigere 30-Tage-Letalitätsrate als von Roques et al. publiziert beobachtet.</p> <p>Zingone et al. (Zingone et al. 2004) haben in einer Untersuchung am eigenen Patientenkollektiv ein ähnliches Phänomen beobachtet. Über einen Zeitraum von fünf Jahren veränderte sich die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalität nur unwesentlich. Allerdings nahm die tatsächlich beobachtete Letalität deutlich ab.</p> <p>Bezogen auf die klinische Praxis sind sowohl die Abnahme der Letalitätsrate bei nahezu unverändertem Risikoprofil der behandelten Patienten als auch eine gleich bleibende Letalitätsrate bei zunehmender Anzahl von Risikopatienten im zeitlichen Verlauf Ausdruck einer Zunahme der Behandlungsqualität.</p> <p>Die Fachgruppe hat daher auf die Festlegung eines Referenzbereichs zu diesem Qualitätsindikator verzichtet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Logistische Regression | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | <p>O / E</p> <p><u>O (observed)</u> ist die beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) mit:</p> <p>Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>E (expected)</u> ist die erwartete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) nach logistischem EuroSCORE und wird berechnet als</p> <p>Mittelwert des EuroSCORE mit der</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I: 6</td> <td>Geburtsdatum</td> <td></td> <td>GEBDATUM</td> </tr> <tr> <td>I: 7</td> <td>Geschlecht</td> <td>1 = männlich 2 = weiblich</td> <td>GESCHLECHT</td> </tr> <tr> <td>I: 14</td> <td>Infarkt(e)</td> <td>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91</td> <td>AUFNBEFUNDINFARKT</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 | AUFNBEFUNDINFARKT |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 | AUFNBEFUNDINFARKT | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| | | Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | |
| I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDSCHO CKKARDIOGEN |
| I: 18 | Reanimation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDREAN IMATION |
| I: 19 | Patient wird beatmet | 0 = nein 1 = ja | AUFNBEFUNDBEAT MUNG |
| I: 22 | pulmonale Hypertonie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDHYPE RTONIEPULMONAL |
| I: 28 | Nitrate (i. v.) | 0 = nein 1 = ja | NITRATEIV |
| I: 29 | Inotrope (i. v.) | 0 = nein 1 = ja | INOTROPEIV |
| I: 37 | LVEF | 1 = schlecht oder < 30% 2 = mittel oder 30% - 50% 3 = gut oder > 50% | LVEF |
| I: 47 | Anzahl | | VOROPANZAHL |
| I: 51 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPKORONARC HIRURGIE |
| I: 52 | Aortenklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPAORTENKLA PPE |
| I: 53 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPMITRALKLA PPE |
| I: 54 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRICUSPIDA LKLAPPE |
| I: 55 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPULMONALK LAPPE |
| I: 56 | Aortenaneurysma / -ektasie | 0 = nein 1 = ja, thorakal 3 = ja, Kombination 9 = unbekannt | VOROPAORTENAN EURYSMA |
| I: 57 | kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPVITIENKONG ENITAL |
| I: 58 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZTUMO R |
| I: 59 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | VOROPPERIKARDE RKRANKUNG |

| | | | |
|-------|---|--|----------------------------|
| | | 9 = unbekannt | |
| I: 60 | Transplantation | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRANSPLANTATION |
| I: 61 | Rhythmuschirurgie | 0 = nein 1 = ja, epikardiale Schrittmacher-Implantation 2 = ja, epikardiale Defibrillator-Implantation 3 = ja, Kombination 4 = ja, antitachykarde OP 8 = ja, andere 9 = unbekannt | VOROPRHYTHMUSCHIRURGIE |
| I: 62 | sonstige Herz-Vor-OP | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZSONSTIGE |
| I: 63 | akute Infektion(en) | 0 = keine 1 = Mediastinitis 2 = Bakteriämie 3 = broncho-pulmonale Infektion 4 = oto-laryngologische Infektion 5 = floride Endokarditis 6 = Peritonitis 7 = Wundinfektion Thorax 8 = Pleuraempym 9 = Venenkatheterinfektion 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten 12 = HIV-Infektion 13 = Hepatitis B oder C 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | INFEKTIONAKUTHCH |
| I: 65 | arterielle Gefäßerkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVK |
| I: 66 | periphere AVK (Extremitäten) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKPERIPHER |
| I: 67 | zum Hirn führende Gefäße | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKHIRNVERSORGEND |
| I: 68 | Aortenaneurysma | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKAORTENANEURYSMA |
| I: 69 | sonstige arterielle Gefäßerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKSONSTIGE |
| I: 70 | Lungenerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, COPD mit Langzeit-Bronchodilatatorentherapie 2 = ja, andere ohne Langzeit-Bronchodilatatorentherapie 8 = ja, andere 9 = unbekannt | LUNGENERKRANKUNGEN |
| I: 71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN |
| I: 74 | Kreatininwert i. S. | | KREATININWERT |

| | | | |
|---------|---|--|------------------------------|
| | (präoperativ) | | GDL |
| I: 75 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMOLL |
| II: 3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| II: 8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| II: 10 | (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung | 0 = nein 1 = ja, IABP 2 = ja, Kreislumpumpe 3 = ja, anderes Assist Device 4 = ja, ECMO | KREISLAUFUNTERSÜTZUNG |
| II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| II: 64 | Verschluss Infarkt-VSD | 0 = nein 1 = ja | VERSORGVERSCHLUSSINFARKTVSD |
| II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| II: 107 | Aszendensersatz suprakoronar | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERATZSUPRAKORONAR |
| II: 108 | Aszendensersatz infrakoronar (Ostiumreimplantation) | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERATZINFRAKORONAR |
| II: 111 | Aortenbogenersatz | 0 = nein 1 = ja | OPAORTENBOGENERSATZ |
| II: 112 | Deszendensersatz | 0 = nein 1 = ja | OPDESCENDENSERATZ |
| II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| III: 62 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus | ENTLGRUND |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>07 = Tod</p> <p>08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)</p> <p>09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung</p> <p>10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung</p> <p>11 = Entlassung in ein Hospiz</p> <p>12 = interne Verlegung</p> <p>13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung</p> <p>14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung</p> <p>17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG</p> <p>18 = Rückverlegung</p> <p>19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung</p> <p>20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation</p> <p>21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme</p> | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | <p>Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar.</p> <p>Die Kennzahl 65560 ist identisch mit der Vorjahreskennzahl 69234. Eine Umstellung erfolgte hier aus rein rechentechnischen Erwägungen.</p> | | | |

66772

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-----------|----------|------|--------------|--|----------|------|------------|------------------------------|------------|-------|------------|---|-----------------------|
| ID-Kennzahl | 66772 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem EuroSCORE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | <p>Die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalitätsrate der deutschen Krankenhäuser lag im Jahr 2002 und 2003 im Leistungsbereich Isolierte Koronarchirurgie mit 4,80% bzw. 5,34% (www.bqs-outcome.de) deutlich über der in der ursprünglichen Publikation angegebenen Rate von 3,4% (Roques et al. 1999), d.h. das Risikoprofil der behandelten Patienten hat im Vergleich zur ursprünglichen EuroSCORE-Population erheblich zugenommen. Gleichzeitig wurde mit 3,26% bzw. 3,27% eine etwas niedrigere 30-Tage-Letalitätsrate als von Roques et al. publiziert beobachtet.</p> <p>Zingone et al. (Zingone et al. 2004) haben in einer Untersuchung am eigenen Patientenkollektiv ein ähnliches Phänomen beobachtet. Über einen Zeitraum von fünf Jahren veränderte sich die nach dem logistischen EuroSCORE zu erwartende 30-Tage-Letalität nur unwesentlich. Allerdings nahm die tatsächlich beobachtete Letalität deutlich ab.</p> <p>Bezogen auf die klinische Praxis sind sowohl die Abnahme der Letalitätsrate bei nahezu unverändertem Risikoprofil der behandelten Patienten als auch eine gleich bleibende Letalitätsrate bei zunehmender Anzahl von Risikopatienten im zeitlichen Verlauf Ausdruck einer Zunahme der Behandlungsqualität.</p> <p>Die Fachgruppe hat daher auf die Festlegung eines Referenzbereichs zu diesem Qualitätsindikator verzichtet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Logistische Regression | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | <p>$(O / E) * O_{\text{Gesamt}}$</p> <p><u>O (observed) ist die beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) mit:</u></p> <p>Zähler: Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>E (expected) ist die erwartete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität) nach logistischem EuroSCORE und wird berechnet als</u></p> <p>Mittelwert des EuroSCORE mit der</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> <p><u>O_{Gesamt} ist die bundesweit beobachtete Letalitätsrate (In-Hospital-Letalität)</u></p> <p>Zähler: Patienten, die bundesweit im Krankenhaus verstorben sind.</p> <p>Grundgesamtheit: Alle Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE, die bundesweit in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I: 6</td> <td>Geburtsdatum</td> <td></td> <td>GEBDATUM</td> </tr> <tr> <td>I: 7</td> <td>Geschlecht</td> <td>1 = männlich 2 = weiblich</td> <td>GESCHLECHT</td> </tr> <tr> <td>I: 14</td> <td>Infarkt(e)</td> <td>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der</td> <td>AUFNBEFUNDINFA RKT</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der | AUFNBEFUNDINFA RKT |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der | AUFNBEFUNDINFA RKT | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | <p>letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | |
| I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | <p>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDSCHECKKARDIOGEN |
| I: 18 | Reanimation | <p>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDREANIMATION |
| I: 19 | Patient wird beatmet | <p>0 = nein 1 = ja</p> | AUFNBEFUNDBEATMUNG |
| I: 22 | pulmonale Hypertonie | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | AUFNBEFUNDHYPERTONIEPULMONAL |
| I: 28 | Nitrate (i. v.) | <p>0 = nein 1 = ja</p> | NITRATEIV |
| I: 29 | Inotrope (i. v.) | <p>0 = nein 1 = ja</p> | INOTROPEIV |
| I: 37 | LVEF | <p>1 = schlecht oder < 30% 2 = mittel oder 30% - 50% 3 = gut oder > 50%</p> | LVEF |
| I: 47 | Anzahl | | VOROPANZAHL |
| I: 51 | Koronarchirurgie | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPKORONARCHIRURGIE |
| I: 52 | Aortenklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPAORTENKLAPPE |
| I: 53 | Mitralklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPMITRALKLAPPE |
| I: 54 | Trikuspidalklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPTRICUSPIDALKLAPPE |
| I: 55 | Pulmonalklappe | <p>0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt</p> | VOROPPULMONALKLAPPE |
| I: 56 | Aortenaneurysma / -ektasie | <p>0 = nein 1 = ja, thorakal 3 = ja, Kombination 9 = unbekannt</p> | VOROPAORTENANEURYSMA |
| I: 57 | kongenitale Vitien | <p>0 = nein</p> | VOROPVITIENKONG |

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| | | 1 = ja 9 = unbekannt | ENITAL |
| I: 58 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZTUMOR |
| I: 59 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPERIKARDERKRANKUNG |
| I: 60 | Transplantation | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRANSPLANTATION |
| I: 61 | Rhythmuschirurgie | 0 = nein 1 = ja, epikardiale Schrittmacher-Implantation 2 = ja, epikardiale Defibrillator-Implantation 3 = ja, Kombination 4 = ja, antitachykarde OP 8 = ja, andere 9 = unbekannt | VOROPRHYTHMUSCHIRURGIE |
| I: 62 | sonstige Herz-Vor-OP | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZSONSTIGE |
| I: 63 | akute Infektion(en) | 0 = keine 1 = Mediastinitis 2 = Bakteriämie 3 = broncho-pulmonale Infektion 4 = oto-laryngologische Infektion 5 = floride Endokarditis 6 = Peritonitis 7 = Wundinfektion Thorax 8 = Pleuraempym 9 = Venenkatheterinfektion 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten 12 = HIV-Infektion 13 = Hepatitis B oder C 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | INFEKTIONAKUTHCH |
| I: 65 | arterielle Gefäßkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVK |
| I: 66 | periphere AVK (Extremitäten) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKPERIPHER |
| I: 67 | zum Hirn führende Gefäße | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKHIRNVERSORGEND |
| I: 68 | Aortenaneurysma | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKAORTENANEURYSMA |
| I: 69 | sonstige arterielle Gefäßkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKSONSTIGE |
| I: 70 | Lungenerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, COPD mit Langzeit-Bronchodilatatore-Therapie 2 = ja, andere ohne Langzeit-Bronchodilatatore-Therapie 8 = ja, andere 9 = unbekannt | LUNGENERKRANKUNGEN |
| I: 71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär | NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN |

| | | | |
|---------|---|---|--------------------------------|
| | | (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | |
| I: 74 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM GDL |
| I: 75 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTM OLL |
| II: 3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| II: 8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| II: 10 | (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung | 0 = nein 1 = ja, IABP 2 = ja, Kreiselpumpe 3 = ja, anderes Assist Device 4 = ja, ECMO | KREISLAUFUNTERS TUETZUNG |
| II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURG IE |
| II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| II: 64 | Verschluss Infarkt-VSD | 0 = nein 1 = ja | VERSORGVERSCHL USSINFARKTVSD |
| II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYS MA |
| II: 107 | Aszendensersatz suprakoronar | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERS ATZSUPRAKORONAR |
| II: 108 | Aszendensersatz infrakoronar (Ostiumreimplantation) | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERS ATZINFRAKORONAR |
| II: 111 | Aortenbogenersatz | 0 = nein 1 = ja | OPAORTENBOGEN ERSATZ |
| II: 112 | Deszendensersatz | 0 = nein 1 = ja | OPDESCENDENSER SATZ |
| II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRAN KUNGEN |
| III: 62 | Entlassungsgrund | 01 = Behandlung regulär beendet 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen 03 = Behandlung aus sonstigen | ENTLGRUND |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | | <p>Gründen beendet</p> <p>04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet</p> <p>05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers</p> <p>06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus</p> <p>07 = Tod</p> <p>08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95 in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)</p> <p>09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung</p> <p>10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung</p> <p>11 = Entlassung in ein Hospiz</p> <p>12 = interne Verlegung</p> <p>13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung</p> <p>14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen</p> <p>16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung</p> <p>17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG</p> <p>18 = Rückverlegung</p> <p>19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung</p> <p>20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation</p> <p>21 = Entlassung mit nachfolgender Wiederaufnahme</p> | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | <p>Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar.</p> <p>Die Kennzahl 66772 ist identisch mit der Vorjahreskennzahl 69235. Eine Umstellung erfolgte hier aus rein rechentechnischen Erwägungen.</p> | | | |

47942

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------|----------|------|---|--|---------------------|------|---------------------|--|----------|-------|------------------|--------------------|------------------|-------|------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------------|-------|------------------------------|--|----------------|-------|----------------|--------------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ID-Kennzahl | 47942 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | 30-Tage-Letalität: Follow-up-Rate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Die Übermittlung des 30-Tage-Follow-up stellt eine zusätzliche freiwillige Leistung herzchirurgischer Krankenhäuser dar. Aus diesem Grund wurde für diese Kennzahl kein Referenzbereich festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Keine Risikoadjustierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten mit bekanntem Status am 30. postoperativen Tag Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV:2</td> <td>Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP</td> <td>0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt</td> <td>STATUS30TAGEPO STOP</td> </tr> <tr> <td>II:3</td> <td>OP-Protokoll Nummer</td> <td></td> <td>OPNUMMER</td> </tr> <tr> <td>II:34</td> <td>Koronarchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>KORONARCHIRURGIE</td> </tr> <tr> <td>II:35</td> <td>Aortenklappenchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:74</td> <td>Mitralklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>MITRALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:36</td> <td>sonstige Operation am Herzen</td> <td>0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation</td> <td>HERZOPSONSTIGE</td> </tr> <tr> <td>II:89</td> <td>Pulmonalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PULMONALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:82</td> <td>Trikuspidalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>TRICUSPIDALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:96</td> <td>Aortenaneurysma/Ektasie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENANEURYSMA</td> </tr> <tr> <td>II:115</td> <td>Kongenitale Vitien</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>VITIENKONGENITAL</td> </tr> <tr> <td>II:118</td> <td>Herztumoren</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HERZTUMOR</td> </tr> <tr> <td>II:124</td> <td>Perikarderkrankung</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PERIKARDERKRANKUNGEN</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | IV:2 | Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP | 0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt | STATUS30TAGEPO STOP | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV:2 | Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP | 0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt | STATUS30TAGEPO STOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Kommentar zur Kennzahl | - |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. |

47944

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------|----------|------|---|--|---------------------|------|---------------------|--|----------|-------|------------------|--------------------|------------------|-------|------------------------|--------------------|--------------|-------|--------------|--------------------|--------------|-------|------------------------------|--|----------------|-------|----------------|--------------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|
| ID-Kennzahl | 47944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate >= 97% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Die Übermittlung des 30-Tage-Follow-up stellt eine zusätzliche freiwillige Leistung herzchirurgischer Krankenhäuser dar. Aus diesem Grund wurde für diesen Qualitätsindikator kein Referenzbereich festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Keine Risikoadjustierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten, die innerhalb von 30 Tagen postoperativ verstarben Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden, deren Status am 30. postoperativen Tag bekannt ist und die in einem Krankenhaus operiert wurden, das eine 30-Tage-Follow-up-Rate von >= 97% aufweisen kann | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IV:2</td> <td>Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP</td> <td>0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt</td> <td>STATUS30TAGEPO STOP</td> </tr> <tr> <td>II:3</td> <td>OP-Protokoll Nummer</td> <td></td> <td>OPNUMMER</td> </tr> <tr> <td>II:34</td> <td>Koronarchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>KORONARCHIRURGIE</td> </tr> <tr> <td>II:35</td> <td>Aortenklappenchirurgie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:74</td> <td>Mitralklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>MITRALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:36</td> <td>sonstige Operation am Herzen</td> <td>0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation</td> <td>HERZOPSONSTIGE</td> </tr> <tr> <td>II:89</td> <td>Pulmonalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PULMONALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:82</td> <td>Trikuspidalklappe</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>TRICUSPIDALKLAPPE</td> </tr> <tr> <td>II:96</td> <td>Aortenaneurysma/Ektasie</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AORTENANEURYSMA</td> </tr> <tr> <td>II:115</td> <td>Kongenitale Vitien</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>VITIENKONGENITAL</td> </tr> <tr> <td>II:118</td> <td>Herztumoren</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>HERZTUMOR</td> </tr> <tr> <td>II:124</td> <td>Perikarderkrankung</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>PERIKARDERKRANKUNGEN</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | IV:2 | Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP | 0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt | STATUS30TAGEPO STOP | II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV:2 | Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP | 0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt | STATUS30TAGEPO STOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II:124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. |
|---|---|

47954

| Definition Kennzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------|-----------|----------|------|--------------|--|----------|------|------------|------------------------------|------------|-------|------------|--|-------------------|-------|-------------------------------------|---|---------------------------|-------|-------------|---|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| ID-Kennzahl | 47954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Bezeichnung QI | 30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate $\geq 97\%$ bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2006 | Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenzbereich 2005 | Es ist kein Referenzbereich zu dieser Qualitätskennzahl festgelegt worden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung zum Referenzbereich 2006 | Die Übermittlung des 30-Tage-Follow-up stellt eine zusätzliche freiwillige Leistung herzchirurgischer Krankenhäuser dar. Aus diesem Grund wurde für diesen Qualitätsindikator kein Referenzbereich festgelegt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referenz Bundesauswertung 2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Methode der Risikoadjustierung: Kennzahl | Keine Risikoadjustierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechenregel | Zähler: Patienten, die innerhalb von 30 Tagen postoperativ verstarben Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden, deren Status am 30. postoperativen Tag bekannt ist und mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE und die in einem Krankenhaus operiert wurden, das eine 30-Tage-Follow-up-Rate von $\geq 97\%$ aufweisen kann | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erläuterung der Rechenregel | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendete Datenfelder | <p>Feldnamen 9.0:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Schlüssel</th> <th>Feldname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I: 6</td> <td>Geburtsdatum</td> <td></td> <td>GEBDATUM</td> </tr> <tr> <td>I: 7</td> <td>Geschlecht</td> <td>1 = männlich 2 = weiblich</td> <td>GESCHLECHT</td> </tr> <tr> <td>I: 14</td> <td>Infarkt(e)</td> <td>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</td> <td>AUFNBEFUNDINFARKT</td> </tr> <tr> <td>I: 17</td> <td>kardiogener Schock / Dekompensation</td> <td>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</td> <td>AUFNBEFUNDSCHOCKKARDIOGEN</td> </tr> <tr> <td>I: 18</td> <td>Reanimation</td> <td>0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt</td> <td>AUFNBEFUNDREANIMATION</td> </tr> <tr> <td>I: 19</td> <td>Patient wird beatmet</td> <td>0 = nein 1 = ja</td> <td>AUFNBEFUNDBEATMUNG</td> </tr> </tbody> </table> | Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDINFARKT | I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDSCHOCKKARDIOGEN | I: 18 | Reanimation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDREANIMATION | I: 19 | Patient wird beatmet | 0 = nein 1 = ja | AUFNBEFUNDBEATMUNG |
| Item | Bezeichnung | Schlüssel | Feldname | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 6 | Geburtsdatum | | GEBDATUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 7 | Geschlecht | 1 = männlich 2 = weiblich | GESCHLECHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 14 | Infarkt(e) | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, weniger als 91 Tage zurück 4 = ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDINFARKT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 17 | kardiogener Schock / Dekompensation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDSCHOCKKARDIOGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 18 | Reanimation | 0 = nein 1 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden 2 = ja, letzte(r) innerhalb der letzten 3 Wochen 3 = ja, letzte(r) länger als 3 Wochen, zurück 8 = ja, letzter Zeitpunkt unbekannt 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDREANIMATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I: 19 | Patient wird beatmet | 0 = nein 1 = ja | AUFNBEFUNDBEATMUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------------|---|---|------------------------------|
| | I: 22 | pulmonale Hypertonie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AUFNBEFUNDHYPERTONIEPULMONAL |
| | I: 28 | Nitrate (i. v.) | 0 = nein 1 = ja | NITRATEIV |
| | I: 29 | Inotrope (i. v.) | 0 = nein 1 = ja | INOTROPEIV |
| | I: 37 | LVEF | 1 = schlecht oder < 30% 2 = mittel oder 30% - 50% 3 = gut oder > 50% | LVEF |
| | I: 47 | Anzahl | | VOROPANZAHL |
| | I: 51 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPKORONARCHIRURGIE |
| | I: 52 | Aortenklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPAORTENKLAPPE |
| | I: 53 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPMITRALKLAPPE |
| | I: 54 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRICUSPIDALKLAPPE |
| | I: 55 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPULMONALKLAPPE |
| | I: 56 | Aortenaneurysma / -ektasie | 0 = nein 1 = ja, thorakal 3 = ja, Kombination 9 = unbekannt | VOROPAORTENANEURYSMA |
| | I: 57 | kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPVITIENKONGENITAL |
| | I: 58 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZTUMOR |
| | I: 59 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPPERIKARDERKRANKUNG |
| | I: 60 | Transplantation | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPTRANSPLANTATION |
| | I: 61 | Rhythmuschirurgie | 0 = nein 1 = ja, epikardiale Schrittmacher-Implantation 2 = ja, epikardiale Defibrillator-Implantation 3 = ja, Kombination 4 = ja, antitachykarde OP 8 = ja, andere 9 = unbekannt | VOROPRHYTHMUSCHIRURGIE |
| | I: 62 | sonstige Herz-Vor-OP | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | VOROPHERZSONSTIGE |
| I: 63 | akute Infektion(en) | 0 = keine 1 = Mediastinitis 2 = Bakteriämie 3 = broncho-pulmonale Infektion 4 = oto-laryngologische Infektion 5 = floride Endokarditis 6 = Peritonitis 7 = Wundinfektion Thorax 8 = Pleuraempym 9 = Venenkatheterinfektion | INFEKTIONAKUTICHH | |

| | | | |
|--------|--|---|-----------------------------|
| | | 10 = Harnwegsinfektion 11 = Wundinfektion untere Extremitäten 12 = HIV-Infektion 13 = Hepatitis B oder C 18 = andere Wundinfektion 88 = sonstige Infektion | |
| I: 65 | arterielle Gefäßerkrankung | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVK |
| I: 66 | periphere AVK (Extremitäten) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKPERIPHER |
| I: 67 | zum Hirn führende Gefäße | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKHIRNVERSORGEND |
| I: 68 | Aortenaneurysma | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKAORTENANEURYSMA |
| I: 69 | sonstige arterielle Gefäßerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | AVKSONSTIGE |
| I: 70 | Lungenerkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, COPD mit Langzeit-Bronchodilatatorentherapie 2 = ja, andere ohne Langzeit-Bronchodilatatorentherapie 8 = ja, andere 9 = unbekannt | LUNGENERKRANKUNGEN |
| I: 71 | neurologische Erkrankung(en) | 0 = nein 1 = ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie) 2 = ja, ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) 3 = ja, peripher 4 = ja, Kombination 9 = unbekannt | NEUROLOGISCHE ERKRANKUNGEN |
| I: 74 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMGDL |
| I: 75 | Kreatininwert i. S. (präoperativ) | | KREATININWERTMOLL |
| II: 3 | OP-Protokoll Nummer | | OPNUMMER |
| II: 8 | Dringlichkeit | 1 = elektiv 2 = dringlich 3 = Notfall 4 = Notfall (Reanimation / ultima ratio) | DRINGLICHKEIT |
| II: 10 | (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung | 0 = nein 1 = ja, IABP 2 = ja, Kreislumpumpe 3 = ja, anderes Assist Device 4 = ja, ECMO | KREISLAUFUNTERSTÜTZUNG |
| II: 34 | Koronarchirurgie | 0 = nein 1 = ja | KORONARCHIRURGIE |
| II: 35 | Aortenklappenchirurgie | 0 = nein 1 = ja | AORTENKLAPPE |
| II: 36 | sonstige Operation am Herzen | 0 = nein 1 = ja, mit freiwilliger Dokumentation 2 = ja, ohne freiwillige Dokumentation | HERZOPSONSTIGE |
| II: 64 | Verschluss Infarkt-VSD | 0 = nein 1 = ja | VERSORGVERSCHLUSSINFARKTVSD |

| | | | | |
|---|---|---|--|------------------------------|
| | II: 74 | Mitralklappe | 0 = nein 1 = ja | MITRALKLAPPE |
| | II: 82 | Trikuspidalklappe | 0 = nein 1 = ja | TRICUSPIDALKLAPPE |
| | II: 89 | Pulmonalklappe | 0 = nein 1 = ja | PULMONALKLAPPE |
| | II: 96 | Aortenaneurysma/Ektasie | 0 = nein 1 = ja | AORTENANEURYSMA |
| | II: 107 | Aszendensersatz suprakoronar | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERATZSUPRAKORONAR |
| | II: 108 | Aszendensersatz infrakoronar (Ostiumreimplantation) | 0 = nein 1 = ja | OPASCENDENSERATZINFRAKORONAR |
| | II: 111 | Aortenbogenersatz | 0 = nein 1 = ja | OPAORTENBOGENERSATZ |
| | II: 112 | Deszendensersatz | 0 = nein 1 = ja | OPDESCENDENSERSATZ |
| | II: 115 | Kongenitale Vitien | 0 = nein 1 = ja | VITIENKONGENITAL |
| | II: 118 | Herztumoren | 0 = nein 1 = ja | HERZTUMOR |
| | II: 124 | Perikarderkrankung | 0 = nein 1 = ja | PERIKARDERKRANKUNGEN |
| | IV:2 | Status des Patienten am 30. postoperativen Tag nach der ersten OP | 0 = Patient ist verstorben 1 = Patient lebt 8 = Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen / Follow-up Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt 9 = Situation des Patienten ist unbekannt | STATUS30TAGEPOSTOP |
| Datenbasis BQS-Spezifikation | 9.0 | | | |
| Teildatensatzbezug | HCH:I | | | |
| Kommentar zur Kennzahl | - | | | |
| Methodische Beurteilung der Vergleichbarkeit mit Vorjahresergebnissen | Die Vorjahresergebnisse sind mit den Ergebnissen 2006 vergleichbar. | | | |